



Dermatologia | Medicamentos | Infecções fúngicas

# ZP dermil®

## Substância activa

Piritiona zinco 5 mg/g

Piritiona zinco 20 mg/g

## Apresentação

Creme – Bisnaga 30 g

Suspensão cutânea (Champô) – Frasco 120 g; Frasco 200 g

## Indicações Terapêuticas

Tratamento e controlo da “caspa”

Tratamento de dermatite seborreica

## Posologia

Creme – 1 a 3 vezes ao dia, na pele afetada do corpo, da face ou do couro cabeludo.

Suspensão cutânea (Champô) – 2 vezes por semana, na pele afetada do couro cabeludo aplicando da seguinte forma:

- Molhar a cabeça com água morna;
- Lavar a cabeça com ZP-Dermil suspensão cutânea (1a vez);
- Enxaguar;
- Lavar de novo com ZP-Dermil suspensão cutânea (2a vez) e deixar actuar o produto durante 5 minutos.
- Enxaguar abundantemente com água limpa.

# ZP dermil®

**INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO | NOME DO MEDICAMENTO** ZP Dermil 20 mg/g suspensão cutânea **COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA** Piritiona zinco a 20 mg/g. Lista completa de excipientes: lauril-éter-sulfato de sódio, cocamidopropilbetaina, E.D.T.A, cloreto de sódio, trietanolamina e água para preparações injetáveis. **FORMA FARMACÉUTICA** Suspensão cutânea **INDICAÇÕES TERAPÉUTICAS** ZP Dermil está indicado em: tratamento e controlo da “caspa” e dermatite seborreica do couro cabeludo. **POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO** Posologia para adultos e crianças com idade superior a 12 anos: Em média o ZP Dermil suspensão cutânea deverá ser utilizado 2 vezes por semana da seguinte forma: 1. Molhar a cabeça com água morna; 2. Lavar a cabeça com ZP Dermil suspensão cutânea (1ª vez); 3. Enxaguar; 4. Lavar de novo com ZP Dermil suspensão cutânea (2ª vez) e deixar actuar o produto durante 5 minutos. 5. Enxaguar abundantemente com água limpa. Fechar bem o frasco após cada utilização. Não deixar entrar em contacto com os olhos. População pediátrica: O ZP Dermil suspensão cutânea destina-se a tratar condições que habitualmente não ocorrem em crianças antes da idade da puberdade. Embora não haja informação específica, comparando com o uso do produto noutros grupos etários, não é de esperar que este medicamento cause problemas ou efeitos adversos diferentes nas crianças. A utilização e a posologia em crianças com idade inferior a 12 anos devem ser determinadas pelo médico. Caso não se venham a registar melhorias no espaço de 4 semanas, a situação deverá ser reavaliada por um médico. Em caso de agravamento dos sintomas, o tratamento deverá ser suspenso. **CONTRAINDICAÇÕES** O ZP Dermil suspensão cutânea está contraindicado em casos de hipersensibilidade à substância ativa piritiona zinco ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO** Deve-se evitar que a suspensão cutânea entre em contacto com os olhos. Se acidentalmente tal suceder, lavar abundantemente com água e consultar um médico. **INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS** Não estão documentadas para o uso cutâneo. **EFEITOS INDESEJÁVEIS** O ZP Dermil é geralmente bem tolerado, contudo raramente podem surgir casos de irritação cutânea e dermatite de contacto. Caso esta situação se verifique deve suspender a medicação e consultar um médico. **Notificação de suspeitas de reações adversas** A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através de: Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoam> (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: **INFARMED, I.P.** Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa, Tel: +351 21 798 73 73 | Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) | E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt) **(v.06/2021) Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado:** Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A. | Av. 25 de Abril, 6-6A - 2795-225 Linda-a-Velha - Portugal